



Cómo hablar de Korlym® con sus proveedores de atención médica

Guía de conversación para pacientes
que toman Korlym® (mifepristona)
tabletas de 300 mg

Korlym®
mifepristone
300 mg Tablets

INDICACIONES E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

¿Qué es Korlym® (mifepristona) tabletas de 300 mg?

Korlym es un medicamento recetado que se usa para tratar el nivel alto de azúcar en la sangre (hiperglucemia) causado por niveles altos de cortisol en la sangre (hipercortisolismo) en adultos con síndrome de Cushing endógeno que tienen diabetes mellitus tipo 2 o intolerancia a la glucosa y que no pueden someterse a cirugía o para quienes la cirugía ha fallado. Korlym no es para personas que tienen diabetes mellitus tipo 2 no causada por el síndrome de Cushing.

Información de suma importancia sobre Korlym

Korlym nunca debe ser tomado por mujeres embarazadas o que puedan quedar embarazadas. Tomar Korlym durante el embarazo dará como resultado la pérdida del embarazo. Se requiere una prueba de embarazo antes de comenzar a tomar Korlym o si el tratamiento se interrumpe por más de 14 días. Hable con su médico sobre cómo prevenir el embarazo.

Consulte información de seguridad importante en la página 11.
Consulte la información de prescripción completa adjunta,
incluida la advertencia del recuadro y la guía de medicación.

Habr  momentos
**en los que visitar  alg n
proveedor de atenci n m dica
diferente del que le recet 
Korlym.** Es importante que
sus proveedores de atenci n
m dica sepan que usted toma
Korlym y c mo puede afectar
su cuidado.

Esta gu a puede ayudarlo a hablar con los
proveedores de atenci n m dica sobre Korlym
y por qu  se lo recetaron.

Tambi n puede ayudarlo a dirigirlos a otros recursos
para que puedan aprender m s.

Korlym[®]
mifepristone
300 mg Tablets

Acerca de Korlym

**PUNTOS CLAVE que debe informar a sus proveedores
de atenci n m dica**



Tengo hipercortisolismo, tambi n llamado
S ndrome de Cushing



Me recetaron Korlym para tratar el nivel
alto de az car en la sangre causado por
el hipercortisolismo



Korlym trabaja para reducir los efectos
negativos del exceso de actividad del cortisol



Korlym no reduce los niveles de cortisol

Mis signos y s ntomas de hipercortisolismo pueden incluir

- Aumento de peso
- Nivel alto de az car en la
sangre o diabetes
- Presi n sangu nea alta
- Estado de  nimo depresivo
- Nivel bajo de energ a
- Cara redondeada
- Problemas de memoria
y para pensar con claridad



Para m s informaci n, visite korlym.com/hcp

INFORMACI N DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Informaci n de suma importancia sobre Korlym (cont.)

Informe a su m dico y farmac utico sobre todos los medicamentos que
toma, incluidos los medicamentos recetados y de venta libre, las vitaminas
y los suplementos a base de hierbas. Korlym y ciertos medicamentos pueden
afectarse entre s  o causar efectos secundarios.

No tome Korlym si:

- est  tomando ciertos medicamentos para el colesterol alto, como
simvastatina (Zocor[®]) o lovastatina (Mevacor[®]), ya que Korlym puede causar
un aumento peligroso en el nivel de estos medicamentos en la sangre

- toma corticosteroides como prednisona para tratar una afecci n
m dica grave
- ha experimentado sangrado vaginal inexplicable, cambios en las
c lulas que recubren su  tero (hiperplasia endometrial) o c ncer
del recubrimiento de su  tero (c ncer endometrial)

**Consulte informaci n de seguridad importante en la p gina 11.
Consulte la informaci n de prescripci n completa adjunta,
incluida la advertencia del recuadro y la gu a de medicaci n.**

Korlym y otros medicamentos

PUNTOS CLAVE que debe informar a sus proveedores de atención médica



Korlym y mis otros medicamentos recetados pueden afectarse entre sí



Korlym se adquiere en una farmacia especializada que se llama SPARK



Si realiza algún cambio en los medicamentos, llame o envíe por fax la lista de medicamentos a la farmacia especializada SPARK para que se verifiquen las interacciones

SPARK

Programa de apoyo para acceso y reembolso de Korlym (Support Program for Access and Reimbursement for Korlym)

La farmacia especializada SPARK está dedicada exclusivamente a pacientes que toman Korlym.



Un **farmacéutico SPARK** está de guardia para ayudar **24 horas al día, 7 días a la semana**

TELÉFONO: 1-855-456-7596 | FAX: 1-877-858-7746

Proveedores de servicios de salud: Para obtener más información, llamen a la farmacia especializada SPARK y soliciten una copia de *Coadministración de pacientes que toman Korlym*

Korlym[®]
mifepristone
300 mg Tablets

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Korlym?

Los pacientes que toman Korlym deben ser monitoreados para detectar efectos secundarios. Los posibles efectos secundarios graves incluyen signos de insuficiencia suprarrenal, niveles bajos de potasio, cambios en el revestimiento del útero, sangrado vaginal y problemas con el sistema eléctrico del corazón.

Los efectos secundarios más comunes de Korlym incluyen náuseas, fatiga, dolor de cabeza, bajo nivel de potasio en la sangre, dolor en brazos y piernas (artralgia), vómitos, hinchazón de brazos y piernas (edema periférico), presión arterial alta, mareos, disminución del apetito, y engrosamiento del revestimiento del útero (hipertrofia endometrial).

Informe a su médico si tiene algún efecto secundario que le moleste o que no desaparezca.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de Korlym. Para más información, consulte a su médico o farmacéutico. Para consejo médico sobre efectos secundarios, llame a su médico.

Antes de tomar Korlym, hable con su médico si está amamantando o planea amamantar.

Consulte información de seguridad importante en la página 11. Consulte la información de prescripción completa adjunta, incluida la advertencia del recuadro y la guía de medicación.

Cómo me puede afectar Korlym

PUNTOS CLAVE que debe informar a sus proveedores de atención médica



Mientras esté tomando Korlym, se deben controlar mis niveles de potasio, azúcar en la sangre y presión arterial



A medida que continúo el tratamiento con Korlym, es posible que necesite ajustar mis medicamentos para la diabetes o para la presión arterial alta

Sus proveedores de atención médica deben conocer los cambios y los efectos secundarios que pueden ocurrir durante el tratamiento con Korlym.

Nivel bajo de potasio (hipocalcemia)

Se puede presentar nivel bajo de potasio en cualquier momento durante el tratamiento con Korlym. Los síntomas de niveles bajos de potasio incluyen dolores musculares, calambres, latidos cardíacos irregulares (palpitaciones) e hinchazón (edema).

Abstinencia de cortisol

La baja actividad del cortisol puede provocar efectos de abstinencia de cortisol, como cansancio, dolores de cabeza, náuseas, hinchazón y dolor en las articulaciones. Estos síntomas generalmente ocurren temprano en el tratamiento y se espera que mejoren con el tiempo.

Consulte la información de prescripción completa adjunta (sección 5.1: Insuficiencia suprarrenal) para obtener más información.

Cambios en el nivel de azúcar en la sangre

Se ha demostrado que Korlym reduce los niveles de azúcar en la sangre en 6 semanas.* Es posible que sea necesario reducir o suspender los medicamentos para la diabetes, incluida la insulina.

Cambios en la presión arterial

Es posible que sea necesario aumentar o disminuir los medicamentos para la presión arterial.

Hinchazón de manos y pies (edema)

Durante el tratamiento con Korlym, puede producirse hinchazón de manos y pies. Si esto sucede junto con un aumento de la presión arterial, puede ser un signo de bajo nivel de potasio.

Sangrado vaginal

Si tiene útero y está tomando Korlym, es posible que tenga sangrado vaginal inusual, como manchado, periodos perdidos, periodos irregulares u otros cambios menstruales. Si nota signos de sangrado inusual, informe a su proveedor de atención médica de inmediato. También se recomienda que le informe a su ginecólogo que usted está tomando Korlym.

Las pacientes no deben usar anticonceptivos hormonales mientras toman Korlym.

Cambios en el ritmo cardíaco (prolongación del intervalo QT)

Korlym no debe usarse con ciertos medicamentos o en pacientes con ciertas afecciones que provoquen cambios en el ritmo cardíaco (intervalo QT prolongado). Si es necesario el tratamiento, siempre se debe usar la dosis efectiva más baja.

Afecciones tratadas con corticosteroides

Korlym no debe ser utilizado por pacientes que estén en terapia con corticosteroides con el fin de salvar la vida.

*En pacientes adultos con hipercortisolismo (síndrome de Cushing endógeno) que tenían diabetes mellitus tipo 2 o intolerancia a la glucosa.

Consulte información de seguridad importante en la página 11.

Consulte la información de prescripción completa adjunta, incluida la advertencia del recuadro y la guía de medicación.

Korlym®
mifepristone
300 mg Tablets

Separe una tarjeta para dejarla con su proveedor de atención médica.

Información importante para proveedores de atención médica

Si tiene preguntas sobre el tratamiento de su paciente, llame al médico que le prescribió.

Nombre del paciente: _____

Nombre del médico que prescribe: _____

Teléfono: _____

Si **comienza o cambia** algún medicamento para este paciente, **llame o envíe por fax la lista de medicamentos del paciente** a la farmacia especializada SPARK para que se verifiquen las interacciones.

Farmacéutico SPARK
Teléfono: 1-855-456-7596
Fax: 1-877-858-7746

Los proveedores de atención médica pueden informar inquietudes de seguridad a la **línea directa de atención médica las 24 horas de Corcept 1-855-844-3270**

Para obtener más información, llame a la farmacia especializada SPARK y solicite una guía para proveedores de atención médica.

Información importante para proveedores de atención médica

Si tiene preguntas sobre el tratamiento de su paciente, llame al médico que le prescribió.

Nombre del paciente: _____

Nombre del médico que prescribe: _____

Teléfono: _____

Si **comienza o cambia** algún medicamento para este paciente, **llame o envíe por fax la lista de medicamentos del paciente** a la farmacia especializada SPARK para que se verifiquen las interacciones.

Farmacéutico SPARK
Teléfono: 1-855-456-7596
Fax: 1-877-858-7746

Los proveedores de atención médica pueden informar inquietudes de seguridad a la **línea directa de atención médica las 24 horas de Corcept 1-855-844-3270**

Para obtener más información, llame a la farmacia especializada SPARK y solicite una guía para proveedores de atención médica.

INDICACIONES E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

¿Qué es Korlym® (mifepristona) tabletas de 300 mg?

Korlym es un medicamento recetado que se usa para tratar el nivel alto de azúcar en la sangre (hiperglucemia) causado por niveles altos de cortisol en la sangre (hipercortisolismo) en adultos con síndrome de Cushing endógeno que tienen diabetes mellitus tipo 2 o intolerancia a la glucosa y que no pueden someterse a cirugía o para quienes la cirugía ha fallado. Korlym no es para personas que tienen diabetes mellitus tipo 2 no causada por el síndrome de Cushing.

Información de suma importancia sobre Korlym

Korlym nunca debe ser tomado por mujeres embarazadas o que puedan quedar embarazadas. Tomar Korlym durante el embarazo dará como resultado la pérdida del embarazo. Se requiere una prueba de embarazo antes de comenzar Korlym o si el tratamiento se interrumpe por más de 14 días. Hable con su médico sobre cómo prevenir el embarazo.

Informe a su médico y farmacéutico sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos recetados y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. Korlym y ciertos medicamentos pueden afectarse entre sí o causar efectos secundarios.

No tome Korlym si:

- está tomando ciertos medicamentos para el colesterol alto, como simvastatina (Zocor®) o lovastatina (Mevacor®), ya que Korlym puede causar un aumento peligroso en el nivel de estos medicamentos en la sangre
- toma corticosteroides como prednisona para tratar una afección médica grave
- ha experimentado sangrado vaginal inexplicable, cambios en las células que recubren su útero (hiperplasia endometrial) o cáncer del recubrimiento de su útero (cáncer endometrial)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Korlym?

Los pacientes que toman Korlym deben ser monitoreados para detectar efectos secundarios. Los posibles efectos secundarios graves incluyen signos de insuficiencia suprarrenal, niveles bajos de potasio, cambios en el revestimiento del útero, sangrado vaginal y problemas con el sistema eléctrico del corazón.

Los efectos secundarios más comunes de Korlym incluyen náuseas, fatiga, dolor de cabeza, bajo nivel de potasio en la sangre, dolor en brazos y piernas (artralgia), vómitos, hinchazón de brazos y piernas (edema periférico), presión arterial alta, mareos, disminución del apetito, y engrosamiento del revestimiento del útero (hipertrofia endometrial).

Informe a su médico si tiene algún efecto secundario que le moleste o que no desaparezca.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de Korlym. Para más información, consulte a su médico o farmacéutico. Para consejo médico sobre efectos secundarios, llame a su médico.

Antes de tomar Korlym, hable con su médico si está amamantando o planea amamantar.

Las advertencias completas y otra información importante de seguridad están disponibles en la información de prescripción completa adjunta, incluida la advertencia del recuadro y la guía de medicación.

Le recomendamos que informe a la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) sobre los efectos secundarios negativos de los medicamentos recetados. Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

Korlym®
mifepristone
300 mg Tablets



¿Necesita ayuda o más información sobre Korlym?
Póngase en contacto con un Defensor del Paciente de Korlym
1-855-295-9969

**Consulte información de seguridad importante en la página 11.
Consulte la información de prescripción completa adjunta,
incluida la advertencia del recuadro y la guía de medicación.**

Korlym[®]
mifepristone
300 mg Tablets

